Manejo del cultivo

- **INTA-AMARILLA** se recomienda sembrar en las Regiones dos, tres, cuatro, cinco y Región Autónoma Costa Caribe Sur del país, en localidades que se encuentren entre 150 y 850 metros sobre el nivel del mar.
- Siembre a distancia de 100 centímetros entre surcos y plantas, para una densidad poblacional de 7,026 plantas por manzana.
- Para un adecuado manejo del cultivo, realice el control de malezas en los 30, 60 y 90 días después de la siembra.
- Fertilice con fórmula completa de alto contenido de fósforo o bien aplique otra alternativa de fertilización agroecológica como bocashi y compost.

Escríbanos: oaip@inta.gob.ni
Búsquenos: www.inta.gob.ni
Véanos en YouTube
Hazte Fans en
Síguenos en

Visítenos: Contiguo a la Estación V de la Policía Nacional, Managua
Telf.:2278-0471

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional

El Pueblo, Presidente!

INTA
Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria

VARIEDAD MEJORADA DE MAÍZ DE GRANO BLANCO

INTA-Amarilla

La reproducción de este material es financiada por:

UNIÓN EUROPEA

PRIICA | Programa Regional de Investigación e Innovación por Cadenas de Valor Agrícola
Innovación tecnológica agrícola para la seguridad alimentaria y nutricional en Centroamérica

IICA

Brochure Yuca INTA-Amarilla PAIPSAN 2017.indd 1 04/05/17 11:34

Variedad de Yuca INTA–AMARILLA

INTA–AMARILLA con un manejo adecuado tiene rendimiento hasta de 361 quintales por manzana, superando el rendimiento promedio nacional de la variedad algodón de 154 quintales por manzana.

Ventajas de la variedad

- Es una variedad de alto contenido nutricional (biofortificada con vitamina A) y alto rendimiento productivo, es apta para consumo fresco e industrial con un 38% materia seca, precenta buenas características culinarias (poca fibra y fácil pelado) y su tiempo de cocción es de 25 minutos.
- Tienen un color muy atractivo y mejor textura que las yucas blancas.

Características de la variedad

1.	Tipo de planta	: Compacta
2.	Forma de la raíz	: Cónica
3.	Color de la cáscara de la raíz	: Amarillo
4.	Color de los brotes tiernos	: Morado
5.	Textura de la piel de la raíz	: Lisa
6.	Color pulpa de la raíz	: Amarillo
7.	Momento de cosecha	: 10 meses
8.	Promedio de raíces por planta	: 7 a 14
9.	Resistente	: Trips y cuero de sapo
10.	Tolerante	: Bacteriosis, Cercospora y Antracnósis

"Este documento bajo la autorización del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA), se reprodujo con el apoyo financiero del Programa Regional de Investigación e Innovación por Cadenas de Valor Agrícola (PRIICA), un programa de la Unión Europea (UE) y el IICA. Los puntos de vista expuestos en él no reflejan la posición oficial de la UE ni del IICA".